

TAMBO EN GENERAL / PUNTOS A TENER EN CUENTA EN EL MES**CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MES**

- Otoño definido, normalmente bien de lluvias, vienen las primeras heladas.

MANEJO DE PASTO Y ALIMENTACIÓN

- Se empieza a cuidar el “bocado de verde”, los crecimientos de pasturas van bajando a 20-25 kg salvo los verdes de invierno en los años de buen clima.
- Se va aumentando la suplementación, se abren los silos, en este año en particular con sequías tan marcadas los campos carecen de recervas.
- Control de plagas sobre todo en las praderas nuevas sembradas a fines de marzo y este mes; trips, pulgón, etc.

AGRICULTURA

- Enrollar colas de cosecha de soja o sorgo cuando se siembra una pastura nueva en directa. También se pueden dejar para ir comiendo si se ve que es tarde para lograr buenos verdes de invierno sobre los rastrojos de maíz-sorgo que no van a praderas nuevas.
- Se termina de hacer la fertilización con nitrógeno y reposición con fósforo y azufre según las evaluaciones efectuadas con los análisis de suelo y planta.
- Sembrar las praderas nuevas.

OTROS RECORDATORIOS REPRODUCTIVOS

- Recordar que si se hace barrial profundo en alguna parte del camino de las vacas es mejor abrir una pasada por el costado desviando por dentro de un lote para que circulen con las ubres limpias y cerrar el barrial hasta que se pueda terraplenar.

PARICIÓN DE ENERO A ABRIL**SITUACIÓN MÁS RELEVANTE DE C/TAMBO SEGÚN ÉPOCA**

- En el tambo quedan las vacas recién paridas y las “vacías de otoño”, que pueden estar preñadas o no del repaso. La producción suele andar entre los 16-18 litros. El % de sólidos viene bajando de 5% de grasa butirosa (GB) y 4% de proteína bruta (PB) de fin de otoño a valores mínimos de 4,2-4,3% de GB y 3,55-3,65% de PB.

MANEJO DE PASTO Y ALIMENTACIÓN

- Sigue la alimentación parto a las vacas que van a parir en marzo, ver posibilidad de que coman gramíneas maduras (maíz rastrojo o en pie, sorgos, evitando leguminosas y pastos tiernos de alto potasio)
- Las terneras nacidas a fines de enero ya debieran estar consumiendo alimento en el orden del medio Kg y para deslechar sobre fines de mes.

RECRÍA

- Se pesan las terneras de otoño año anterior, deberían estar por los 235-250 kg.

SANIDAD Y REPRODUCCIÓN

- Si las vacas a parir en abril son pocas, se puede planear su inducción o traslado a otros tambos si no hacen falta para completar número de VO planificado.
- Las vacas en ordeño “vacías de otoño” muchas de ellas preñadas de invierno deben ir a otros destinos a medida que se va completando el número de vacas de ordeño previsto con paridas.

PARICIÓN DE JUNIO A AGOSTO**SITUACIÓN MÁS RELEVANTE DE C/TAMBO SEGÚN ÉPOCA**

- Las vacas vienen bajando en su 7-8 mes de producción a niveles de 14-16 litros

MANEJO DE PASTO Y ALIMENTACIÓN

- Cuidar de seguir dando de comer bien a las vacas de buena producción, posibilidad de hacer un lote de vacías para comer mejor y volver a dar servicio a fines de abril con algún protocolo.

RECRÍA

- Se pesan las terneras del año anterior, deberían estar en 160-170 kg. Se desparasita si corresponde.

CALIDAD DE LECHE

- Se realiza cuarto y último control lechero continuar seleccionando los vientres de baja producción a descartar, así como también por otros motivos no productivos como crónicas de mastitis, rengas, etc.

ADMINISTRACIÓN

- Se calculan las necesidades de insumos a utilizar en la etapa del secado, sobre todo pomas de secado y vacunas parto, se piden presupuestos y se realiza la compra.
- Se calcula con tiempo los insumos para la futura parición, como para comprarlos a tiempo y que estén en el campo cuando se necesiten.